



محله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
جلد دوم، شماره چهارم، زمستان ۸۸

۱۱۳-۱۳۴
www.ejcp.info



دانشگاه علم و فناوری شهرضا

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گلرنگ بهاره به تنش سوری در مراحل مختلف رشد

*مجید جامی‌الاحمدی^۱، محمدعلی بهدانی^۱ و علی رحیمی^۲

^۱ استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند،

^۲ کارشناس مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

تنش سوری یکی از مهمترین تنش‌های محیطی است که تولیدات کشاورزی را در ایران با محدودیت مواجه ساخته است و از این رو معروفی ارقام مناسبی که دارای عملکرد مطلوب در شرایط تنش سوری باشند، موجب افزایش بازده تولید می‌شود. بهمنظور مطالعه واکنش ارقام گلرنگ بهاره به تنش سوری، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوك‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. سه زمان اعمال تنش سوری، در مراحل شاخه‌دهی، تکمه‌دهی و گلدهی، به عنوان تیمار اصلی و سه ژنتیپ گلرنگ شامل محلی اصفهان، PI، و IL111 به عنوان تیمار فرعی در نظر گرفته شدند. تنش سوری با استفاده از آبی با شوری ۸/۶ دسی‌زیمنس بر متر اعمال شد. نتایج حاصل نشان داد که در کل شوری تأثیر غیرمعنی داری بر اجزاء عملکرد ارقام گذاشت، ولی برآیند همین تغییرات اندک سبب شد که عملکرد بذر و روغن و درصد روغن به طور معنی داری تحت تأثیر زمان اعمال سوری قرار گیرند. ارقام مورد بررسی نیز از نظر عملکرد دانه و روغن و اکثر اجزاء عملکرد با یکدیگر تفاوت نشان دادند و از این نظر رقم محلی اصفهان برتری قابل ملاحظه‌ای نسبت به دو رقم دیگر نشان داد. برش‌دهی اثر متقابل ارقام در هر سطح سوری نشان داد که تفاوت عمدی بین ارقام به واکنش آنها به شوری اعمال شده در زمان تکمه‌دهی بر می‌گشت و در این زمان رقم محلی اصفهان برتری محسوسی از جنبه تعداد و وزن بذور تولیدی نسبت به دو رقم دیگر نشان داد. در کل به نظر می‌رسد که رقم محلی اصفهان، خوب‌ذیری بیشتری به شرایط آبیاری با آب شور داشته و در صورتی که در حدفاصل بین زمان تکمه‌دهی تا گلدهی کامل، با آب شیرین آبیاری شود، می‌تواند عملکرد قابل قبولی تولید نماید.

واژه‌های کلیدی: گلرنگ، ارقام، عملکرد، درصد روغن، سوری

* - مسئول مکاتبه: mja230@yahoo.com

مقدمه

به رغم پیشرفت‌های قابل توجه در گسترش کشاورزی و تولید غذا در سال‌های اخیر، تعداد افراد دچار سوء‌تغذیه در جهان همچنان رو به افزایش است. با افزایش جمعیت و نیاز به تولید غذای بیشتر، گرایش به استفاده از منابع آب و خاک شور بیشتر شده و تجارب بسیاری هم‌اکنون در سرتاسر دنیا در مورد استفاده از این منابع نامطلوب وجود دارد (هاشمی‌نیا و همکاران، ۱۹۹۷). با استفاده مناسب و مدیریت شده از آب‌های شور می‌توان فراهمی آب برای آبیاری را افزایش داد، به ویژه که مقادیر قابل توجهی از چنین آب‌هایی در مکان‌های مختلف جهان در دسترس می‌باشند (رووز و همکاران، ۱۹۹۲). راهکارهای فنی متعددی که جهت استفاده از این منابع آب شور پیشنهاد شده است (برای مثال، رووز و همکاران، ۱۹۹۲؛ هاشمی‌نیا و همکاران، ۱۹۹۷)، که یکی از مهم‌ترین آنها، استفاده از آب‌های شیرین در مراحل رشدی حساس به شوری و استفاده از آب شور در مابقی فصل رشد گیاهان است که در این راستا تعیین مراحل رشدی حساس به شوری گیاهان زراعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

گیاهان تحمل متفاوتی به شوری دارند و ممکن است، به ویژه پس از استقرار، کاملاً به آن مقاوم باشند. گلنگ یکی از گیاهان زراعی نسبتاً مقاوم به شوری به حساب می‌آید و در شرایط شور نیز قادر به تولید محصول قابل قبولی است. آستانه تحمل به شوری گلنگ بالا بوده (حدود ۷/۵ دسی‌زیمنس بر متر برای عصاره اشیاع خاک) و آستانه کاهش عملکرد آن ۶ دسی‌زیمنس بر متر می‌باشد (شانون، ۱۹۹۷). سطوح شوری که موجب کاهش ۵۰ درصد در جوانه‌زنی و عملکرد آن می‌شود به ترتیب معادل ۱۲ و ۱۴ دسی‌زیمنس می‌باشد که بدین ترتیب بعد از گیاهانی همچون جو، پنبه، چغندر قند و سورک و بالاتر از گندم، یونجه، ذرت، برنج، بقولات و سایر گیاهان زراعی قرار می‌گیرد (فائق، ۱۹۹۸؛ شانون، ۱۹۹۷؛ هانس-هینینگ و همکاران، ۲۰۰۴). بنابراین می‌توان از آب شور برای آبیاری گلنگ استفاده کرد بدون این که سبب کاهش عملکرد شود، مشروط به این که سطوح مؤثر شوری آب و خاک در کمتر از حد ۸ دسی‌زیمنس بر متر نگه داشته شود (باسیل و کافکا، ۲۰۰۲).

مقاومت به شوری اکثر گیاهان در مراحل مختلف رشدی متفاوت است. بسیاری از گیاهان طی جوانه‌زنی تقریباً به شوری مقاوم هستند، اما طی سبزشدن و مراحل اولیه رشد گیاهچه‌های به شوری حساس می‌شوند (رووز و همکاران، ۱۹۹۲). مقاومت گلنگ نیز در مراحل مختلف رشد به شوری متفاوت است. برای مثال تحمل گیاهچه‌های گلنگ به شوری تقریباً برابر نیمی از مقاومت آن به

شوری در مراحل بعدی می‌باشد (فرانکوئیس و برنسنین، ۱۹۶۴؛ شانون، ۱۹۹۷؛ هانس-هینینگ و همکاران، ۲۰۰۴). مشاهده شده است که عملکرد بذر گلرنگ تا شوری ۶/۷ دسی‌زیمنس بر متر تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد (پاسیل و کافکا، ۲۰۰۲)، و زمانی که شوری به حدود ۱۴ دسی‌زیمنس بر متر می‌رسد، عملکرد به نصف کاهش می‌یابد (هانس-هینینگ و همکاران، ۲۰۰۴). به نظر می‌رسد که تحت شرایط شوری، تعداد دانه در طبق تغییری نمی‌کند، اما تعداد طبق و نیز وزن دانه کاهش می‌یابد (هانس-هینینگ و همکاران، ۲۰۰۴).

مقاومت به شوری در بین ارقام گلرنگ متفاوت بوده (هانس-هینینگ و همکاران، ۲۰۰۴) و به نظر می‌رسد عوامل ژنتیکی در این امر دخیل می‌باشند. بدیهی است که استفاده از ارقام مقاوم به شوری به همراه مدیریت زراعی مناسب، امکان بهره‌برداری از اراضی شور را فراهم می‌سازد (اشرف و اولیری، ۱۹۹۶). مشخص شده است که بین ارقام مختلف گلرنگ از نظر تعداد طبق فرعی (احسان‌زاده و زارعیان‌بغدادآبادی، ۲۰۰۳)، وزن هزاردانه (احسان‌زاده و زارعیان‌بغدادآبادی، ۲۰۰۳؛ مجذنصیری و همکاران، ۲۰۰۳؛ فرید و احسان‌زاده، ۲۰۰۶)، شاخص برداشت (کوتروباس و همکاران، ۲۰۰۴)، تعداد دانه در طبق و بوته (مجذنصیری و همکاران، ۲۰۰۳) عملکرد و درصد روغن (راشدمحصل و بهدانی، ۱۹۹۵؛ مجذنصیری و همکاران، ۲۰۰۳؛ هانس-هینینگ و همکاران، ۲۰۰۴؛ فرید و احسان‌زاده، ۲۰۰۶) و سایر صفات تفاوت وجود دارد.

شوری همچنین ممکن است سبب تغییراتی در ترکیب محصول تولیدی شود (رووز و همکاران، ۱۹۹۲). عملکرد روغن گیاهان روغنی از طریق کاهش عملکرد بذر و نیز از طریق کاهش درصد روغن بذر تحت تأثیر شوری قرار می‌گیرد (هانس-هینینگ و همکاران، ۲۰۰۴). میزان روغن دانه‌های گلرنگ ممکن است بسته به رقم تا ۶۰ درصد نیز برسد هر چند افزایش شوری معمولاً باعث کاهش درصد روغن می‌شود (هانس-هینینگ و همکاران، ۲۰۰۴). دیده شده است که افزایش شوری از صفر به غلاظت‌های زیاد نمک موجب کاهش درصد روغن از ۳۸/۴ به ۳۴ درصد شده است. هر چند به نظر می‌رسد که در شرایط تنفس شوری نسبت اسیدهای چرب زیاد تغییر نمی‌کند، ولی درصد پوسته بذر افزایش می‌یابد (نالز، ۱۹۸۹؛ شانون، ۱۹۹۷؛ زینلی، ۱۹۹۹؛ هانس-هینینگ و همکاران، ۲۰۰۴). کاشت گلرنگ به منظور استحصال روغن می‌باشد، بنابراین تأثیر شوری بر عملکرد روغن بسیار حائز اهمیت است (نالز، ۱۹۸۹). شوری سبب ایجاد نوساناتی در محتوای روغن بذر گلرنگ می‌شود (هانس-هینینگ و همکاران، ۲۰۰۴)، که به نظر می‌رسد علاوه بر عوامل ژنتیکی، مرحله تأثیرگذاری شوری نیز

در این امر دخیل باشد که نیاز به بررسی و تعیین حساس‌ترین مرحله رشدی گیاه جهت اجتناب از تأثیر منفی شوری دارد.

در حال حاضر اکثر خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران به‌نحوی تحت تأثیر شوری می‌باشند و شوری و تنفس حاصل از آن یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین تنفس‌های محیطی است که تولیدات کشاورزی را در کشور ما با محدودیت مواده ساخته است (کافی و همکاران، ۲۰۰۸). این مسأله به ویژه در سال‌های اخیر در استان خراسان جنوبی به‌دلیل موقعیت ویژه آن در حاشیه کویر مرکزی ایران و نیز شرایط اقلیمی خشک آن نمود ویژه‌ای یافته و سطح گستره‌ای از اراضی این استان هم‌اکنون با مشکل فراینده گسترش شوری مواده‌اند، و بدیهی است با توجه به تغییرات اقلیمی، تأثیرگذاری شوری در آینده شدت بیشتری خواهد گرفت. از طرف دیگر گیاهان روغنی متداول نسبت به شوری حساس می‌باشند، که این امر گسترش کشت این گیاهان را در این استان با محدودیت مواده ساخته است، در حالی که گلنگ به لحاظ بومی بودن و سازگاری با شرایط اقلیمی حاکم بر کشور، و سازگاری آن به مناطق گرم و خشک و تحمل پذیری و مقاومت آن به شرایط محدودیت رطوبت و شوری و امکان کشت بهاره و پاییزه، به همراه نقش مفید آن در تناسب زراعی (زینلی، ۱۹۹۹؛ داجو و موندل، ۱۹۹۶) می‌تواند در الگوی کاشت این مناطق وارد شود. در این بین شناخت ارقامی که توان سازگاری بهتری با این شرایط دارند، گامی مهم در دستیابی به عملکردۀای قابل قبول می‌باشد. لذا این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع و با هدف ارزیابی و بررسی تفاوت واکنش ارقام مختلف گلنگ به شرایط شوری اعمال شده در مراحل مختلف رشدی، انجام شد تا ضمن تحقق اهداف فوق، زمینه انجام پژوهش‌ها و بررسی‌های بعدی نیز فراهم گردد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه در سال ۱۳۸۶ به صورت طرح کرت‌های خرد شده با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه رقم گلنگ (محلى اصفهان، IL111 و PI) به عنوان تیمار فرعی بود که در مراحل مختلف رشدی تحت آبیاری با آب شور با هدایت الکتریکی حدود ۸/۶ دسی‌زیمنس بر متر قرار گرفتند. مراحل انتخابی جهت اعمال تنفس شوری به عنوان تیمار اصلی به ترتیب شامل شاخه‌دهی (آغاز طویل شدن جوانه‌های جانبی به طول حدود ۱ سانتی‌متر در ۵۰ درصد بوته‌ها)، تکمه‌دهی (تشکیل جوانه زایشی به صورت تکمه‌ای با قطر ۱

سانتی‌متر در انتهای ساقه اصلی ۵۰ درصد بوته‌ها) و گلدهی (خروج گل‌ها در ۵۰ درصد از طبقه‌ای ساقه اصلی هر کرت) بودند (یساری و همکاران، ۲۰۰۵).

آب شور مورد نیاز از چاه آب موجود در مزرعه آموزشی دانشکده تأمین شد که پس از ذخیره‌سازی در تانکر، در زمان مورد نظر به کار می‌رفت. ویژگی‌های آب مورد استفاده در آزمایش در جدول ۱ ارایه شده است. هر کرت از ۷ خط کاشت به طول ۶ متر و با فاصله ردیف ۵۰ سانتی‌متر از یکدیگر تشکیل شده و بذور در هر خط کاشت با فاصله ۸ سانتی‌متر از یکدیگر کشت شدند. به منظور جلوگیری از تداخل تیمارهای شوری در تیمارهای مجاور، بین هر دو کرت اصلی ۱۵۰ سانتی‌متر (ردیف)، بین دو کرت فرعی ۵۰ سانتی‌متر (یک ردیف) و نیز بین تکرارها فاصله‌ای به عرض ۱۵۰ سانتی‌متر به عنوان حاشیه به صورت کشت نشده رها شد.

جدول ۱- نتایج تجزیه و تحلیل شیمیایی آب مورد استفاده در آزمایش.

غذاظت یون‌های محلول (میلی‌اکی‌والانت بر لیتر)					EC (dSm ⁻¹)	SAR	pH
Cl ⁻	K ⁺	Mg ⁺⁺	Ca ⁺⁺	Na ⁺			
۷۴/۴	۰/۴۰	۲۶/۶	۱۲/۴	۴۸/۷	۸/۶	۱۱/۰۳	۶/۳

کود مصرفی بر مبنای ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفات آمونیم و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار اوره در نظر گرفته شد که تمامی کود فسفات و یک سوم کود اوره قبل از کاشت به خاک اضافه شده و سپس مابقی کود اوره به صورت سرک طی فصل رشد در دو مرحله (هم‌زمان با تنک و ساقه‌دهی) مصرف شد. کاشت در پانزدهم فروردین ماه با دست انجام شده و مزرعه بلافاصله آبیاری شد. دور آبیاری بر مبنای ۷ روز انتخاب شد و آبیاری تمام کرتهای تراز زمان اعمال تیمار شوری با آبی با شوری ۱/۵ دسی‌زیمنس بر متر انجام شد. از خاک مزرعه قبل از شروع آزمایش یک نمونه کلی گرفته شد و پس از اتمام آزمایش نیز از هر تیمار شوری یک نمونه خاک جداگانه تهیه و ویژگی‌های خاک توسط آزمایشگاه خاک‌شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نوع بافت خاک، شنی لومی تعیین شد (جدول ۲). سه هفته بعد از سبزشدن، گیاه‌چهای ترازین به تراکم مورد نظر تنک شدند. در زمان رسیدگی گیاه و زرده‌شدن تمامی بوته‌ها، پس از حذف اثر حاشیه ابتدا از هر کرت ۵ بوته به طور تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه منتقل و اجزاء عملکرد مانند تعداد طبق، وزن هر طبق، تعداد دانه در طبق و وزن هزاردانه، تعیین شدند. سپس تمامی بوته‌های موجود در

سطحی معادل ۳ مترمربع برداشت شده و عملکرد نهایی در واحد سطح تعیین شد. در پایان درصد روغن دانه‌های تولیدی توسط روش سوکسیله بر مبنای یک نمونه ۵۰ گرمی از دانه‌های هر کرت تعیین و عملکرد روغن بر مبنای آن محاسبه شد.

جدول ۲- نتایج تجزیه و تحلیل خاک قطعه آزمایشی، قبل و پس از اعمال تیمارهای آزمایشی.

رس	سیلت	شن	SP	Ca	Na	K	P	N	EC (dSm ⁻¹)	pH				
											(درصد)	meq.l ⁻¹	mg.kg ⁻¹	ppm
۸	۱۷	۷۵	۲۷/۶	۲/۷	۱۰/۴	۱۲۷/۳	۶/۰	۹۶/۶	۲/۰۴	۷/۸۷	قبل از آزمایش			
											بعد از آزمایش			
۸	۲۰	۷۲	۲۴/۴	۳۳/۰	۱۳۹/۵	۱۴۰/۴	۱۴/۲	۸۹/۶	۲۵/۲۰	۷/۴	شاخه‌دهی			
۹	۱۹	۷۲	۲۵/۵	۳۳/۳	۹۴/۷	۱۵۹/۴	۸/۲	۸۴	۱۷/۲۴	۷/۴۱	تکمده‌ی			
۸	۲۱	۷۱	۲۸/۶	۱۹/۷	۷۰/۴	۱۳۱/۳	۵/۰	۸۶/۸	۱۲/۷۳	۷/۴۱	گلده‌ی			

تجزیه آماری با استفاده از بسته‌های نرم افزاری Genstat و SAS انجام شد و تمامی نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel رسم شدند. مقایسات میانگین با استفاده از حداقل اختلاف معنی‌دار (LSD) انجام شد.

نتایج و بحث

براساس نتایج آزمون خاک، هرچه شوری زودتر اعمال شد، هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک افزایش یافت که در اثر تجمع میزان املاح بیشتر به ویژه سدیم در خاک بود (جدول ۲). این موضوع سبب شد گیاهان میزان تنفس بیشتری را تجربه نمایند. با این وجود اثر زمان اعمال شوری بر هیچ‌یک از اجزاء عملکرد معنی‌دار نشد، ولی ارقام مورد استفاده تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر نشان دادند (جدول ۳). عدم معنی‌دار شدن اثر شوری بر اجزاء عملکرد در حالی بود که اعمال زودتر شوری (در زمان شاخه‌دهی) نسبت به اعمال آن در زمان گلده‌ی موجب کاهش تعداد طبق به میزان ۱۵/۱ درصد در هر مترمربع گردید. وزن طبقه‌های تولیدی ۲۳/۳ درصد کمتر بود که خود به دلیل تولید ۲۱/۵ درصد دانه کمتر در این تیمار شوری بود (جدول ۴). توکلی (۲۰۰۲) در بررسی اثر تنفس خشکی بر گلنگ دریافت که عدم آبیاری گلنگ قبل از گلده‌ی موجب کاهش تعداد دانه در طبق می‌شود، در حالی که

اعمال تنش خشکی پس از پایان گلدهی تأثیر اندکی بر تعداد دانه داشته و بیشتر موجب کاهش وزن هزاردانه می‌شود. کافی و رستمی (۲۰۰۷) نیز در بررسی اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی در ارقام مختلف گلرنگ بهاره در شرایط آبیاری با آب شور دریافتند که قطع آبیاری در مرحله تشکیل تکمه‌ها، موجب کاهش معنی‌دار تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزاردانه می‌شود. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عدم معنی‌دار شدن تفاوت بین صفات اجزاء عملکرد با وجود اختلاف زیاد (جدول ۴) به دلیل کوچک بودن درجه آزادی خطای آزمایش (اثر بلوك در شوری) باشد که خود ناشی از تکرار کم در نظر گرفته شده در این آزمایش است که سبب افزایش معیار F جدول می‌شود (سلطانی، ۲۰۰۶). هر چند باید توجه داشت که به دلیل ماهیت این آزمایش مزرعه‌ای و اجبار در ذخیره‌سازی آب در تانکر قبل از انجام آبیاری توسط لوله جهت حصول اطمینان از به کار رفتن حجم آب مساوی در کرت‌های آزمایشی، حجم محدود ذخیره‌سازی تانکرهای موجود در محل آزمایش خود مانعی در راه افزایش وسعت طرح و تعدد تکرارهای آزمایشی بود.


بین ارقام از نظر تعداد و وزن طبق‌های تولیدی و نیز وزن هزاردانه و تعداد بذر تولیدی تفاوت معنی‌داری وجود داشت (جدول ۳)، و هر یک از ارقام در برخی از اجزاء عملکرد بر دیگران برتری نشان دادند (جدول ۴). در کل چنین به نظر می‌رسد که بیشترین تفاوت بین ارقام به صفات مرتبط با طبق‌های فرعی بر می‌گردد. به عبارت دیگر در حالی که هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری از نظر تعداد و وزن طبق‌های اصلی و نیز وزن بذر تولیدی در طبق‌های اصلی بین ارقام وجود نداشت، راهبردهای خوب‌پذیری گیاه به شرایط حاکم و انعطاف‌پذیری در واکنش‌های آنها بیشتر به تغییر در ویژگی‌های مرتبط با تعداد و وزن طبق‌های ثانویه برمی‌گشت (جدول‌های ۳ و ۴). تفاوت بین ارقام ایرانی از نظر وزن هزاردانه، تعداد طبق، تعداد دانه و عملکرد قبل‌گزارش شده است (مجدى‌نصيرى و همکاران، ۲۰۰۳).

١٣٠

جدول ٤- تأثير مفات خاصات علاجکرد و اجزاء علاجکرد دانه و دو غیره بر تقدیم گلریگ بهاره تحت تأثیر اعمال شوری در مراعا، مختلف و رشته.

شکل (۱) وابستگی وزن کل بذور تولیدی را به سهم هر یک از طبقه‌های اصلی و فرعی در تولید بذر در سطوح مختلف شوری و نیز در بین ارقام نشان می‌دهد. بررسی شکل (۱) و معادلات برآش‌یافته برای هر سطح شوری (جدول ۷) نشان می‌دهد که اعمال شوری در زمان شاخه‌دهی سبب تغییر چندانی در شب معادله رگرسیونی برآش‌یافته برای طبقه‌های اصلی و فرعی نشد، در حالی که اعمال شوری در زمان تکمه‌دهی سبب واگرایی و اعمال آن در زمان پرشدن دانه‌ها سبب همگرایی خطوط برآش‌یافته برای ارتباط بین وزن بذر در طبقه‌های اصلی و یا فرعی با وزن کل بذور تولیدی شد (شکل ۱). به عبارت دیگر، در زمانی که تنش در مرحله تکمه‌دهی اعمال شد، عملکرد بالاتر مربوط به گیاهانی بود که وزن بذر طبقه‌های اصلی آنها بیشتر بود. به بیان دیگر، حصول عملکردهای بالاتر در این تیمار با تولید بذور بیشتر و وزن کل بذر بالاتر در طبقه‌های اصلی همراه بود. بدیهی است به دلیل این که بذور طبقه‌های اصلی زودتر تشکیل شده و تخصیص مواد به آنها بیشتر است، وزن بالاتری نسبت به بذوری دارند که دیرتر در طبقه‌های فرعی شکل می‌گیرند. گرچه در این آزمایش تعداد بذرهای موجود در طبقه‌های اصلی و فرعی به طور جداگانه شمارش نشد، ولی بررسی رابطه بین کل تعداد بذور تشکیل شده با وزن کل آنها نشان می‌دهد که با افزایش تعداد بذر در تیمار تنش در زمان تکمه‌دهی، وزن کل بذور با شبیه بیشتری افزایش یافت (شکل ۲، جدول ۷). کوتربوس و همکاران (۲۰۰۴) در بررسی چند رقم گلرنگ در فصول مختلف به این نتیجه رسیدند که افزایش وزن خشک بذر در یک سال نسبت به سال دیگر، مربوط به برتری افزایش تعداد بذر در طبق بوده است. اعمال تنش شوری بعد از تکمه‌دهی (در زمان گلدهی) به دلیل فاصله زمانی بین اعمال شوری تا بروز اثر آن، تأثیری بر بارور شدن گل‌های طبقه‌های اصلی و فرعی نگذاشت و بنابراین در این مرحله هرچه گیاهان توان بیشتری برای تولید ماده خشک و اختصاص آن به بخش‌های زایشی داشتند، دانه‌های طبقه‌های فرعی سهم بیشتری در کل وزن دانه‌های تولیدی را به خود اختصاص می‌دادند (شکل ۱، جدول ۷)؛ هر چند بدیهی است که در این حالت بذرهای تشکیل‌یافته در طبقه‌های فرعی از وزن کمتری برخوردار بوده و باعث شدند که واکنش وزن کل بذور تولیدی به تعداد آنها از شبیه کمتری برخوردار باشد (شکل ۲، جدول ۷). به رغم این موضوع، چگونگی پراکنش نقاط برای طبقه‌های اصلی و فرعی (شکل ۱) نشان‌گر سهم بیشتر طبقه‌های اصلی در تمامی تیمارهای شوری در کل وزن بذور تولیدی می‌باشد. به عبارت دیگر در این شرایط تنش، با وجود تشکیل طبقه‌های فرعی، این طبقه‌ها احتمالاً


به دلیل عدم حمایت از سوی منبع در تأمین مواد فتوستتری نتوانستند به سهم زیادی در عملکرد کل دست یابند. هر چند کوتربوس و همکاران (۲۰۰۴) در آزمایش خود تحت شرایط عدم تنش نتیجه‌گیری کردند که عملکرد گلنگ احتمالاً با محدودیت مخزن مواجه می‌باشد.



شکل ۱- رابطه بین کل وزن تولیدی در واحد سطح با وزن بذر در طبق‌های اصلی (علایم توخالی) و فرعی (علایم توپر) گیاه در سطوح مختلف شوری (شکل الف) و ارقام مختلف (شکل ب). در شکل الف، تیمارهای شوری عبارتند از اعمال شوری در مراحل شاخدهی (مثلث، خط راست)، تکمهدهی (دایره، خط نقطه‌چین) و گلددهی (مریع، خط منقطع). ارقام مورد آزمایش شامل PI (مریع، خط منقطع)، IL111 (دایره، خط نقطه‌چین). و محلی اصفهان (مثلث، خط راست) می‌باشند. معادلات خطوط وایازی در جدول ۷ ارایه شده‌اند.

یکی دیگر از اثرات شوری، تأثیرگذاری بر رابطه بین وزن طبق‌ها با تعداد بذر بود. به طورکلی، با افزایش تخصیص مواد به طبق‌ها و افزایش وزن آنها، تعداد بذر تولیدی نیز افزایش پیدا کرد، هر چند شبی افزایشی در زمان اعمال شوری در مرحله شاخدهی بیشتر از مراحل دیگر بود (شکل ۳، جدول ۷). داده‌های جدول (۴) نشان می‌دهند که برغم این موضوع، گیاهان در هر دو تیمار تنشی که بعد از تشکیل طبق‌ها اعمال شده بودند، به طور یکسان حدود ۳۹ درصد از ماده خشک تجمع یافته در طبق‌ها مربوط به بذر بود، در حالی که این مقدار در تیمار تنش در زمان شاخدهی، ۴۴ درصد بود. به عبارت دیگر، هنگامی که شوری در مرحله شاخدهی اعمال شد، به دلیل محدودیت زودهنگامی که برای گیاه ایجاد نمود سبب کاهش سهم بخش‌های غیردانه‌ای طبق شد، به طوری که در این حالت بهایی هر گرم وزن طبق، حدود ۱۴/۱ عدد بذر در این تیمار تشکیل شد، در حالی که این میزان در تیمارهای تنش در تکمهدهی و پرشدن دانه به ترتیب ۱۲/۹ و ۱۳/۸ عدد بذر بود. با کسر وزن کل بذر تولیدی در واحد


سطح از وزن کل طبق‌ها نیز مشخص می‌شود که میزان وزن بخش‌های غیربذری طبق در تیمارهای اعمال شوری در شاخه‌دهی، تکمه‌دهی و گلدهی به ترتیب $221/9$ ، $305/7$ و $312/5$ گرم بود که نشان می‌دهد هرچه محدودیت حاصل از تنفس در مرحله زودتری از دوره رشدی گیاه رخ داد، سبب ایجاد محدودیت بیشتری برای گیاه شده و گیاه در این حالت به عنوان یک راهکار خوب‌پذیری، از سهم بخش‌های دیگر به نفع تولید بذر خود کاسته است.



شکل ۲- رابطه بین کل تعداد بذر تولیدی در واحد سطح با وزن کل بذر در سطوح مختلف شوری (شکل الف) و ارقام مختلف (شکل ب). در شکل الف، تیمارهای شوری عبارتند از اعمال شوری در مراحل شاخه‌دهی (خط راست)، تکمه‌دهی (○، خط نقطه‌چین) و گلدهی (■، خط منقطع). ارقام مورد آزمایش شامل PI (■، خط منقطع)، IL111 (○، خط نقطه‌چین)، و محلی اصفهان (▲، خط راست) می‌باشند. معادلات خطوط وایازی در جدول ۷ ارایه شده‌اند.

در حالی که تفاوتی بین ارقام از نظر تعداد طبق‌های اصلی وجود نداشت، رقم IL111 به‌طور معنی‌داری تعداد طبق فرعی کمتر و در نتیجه تعداد کل طبق کمتری نسبت به دو رقم دیگر تولید نمود (جدول ۴). با این وجود، وزن بالاتر طبق‌های اصلی این رقم سبب شد که با وجود وزن بسیار کمتر طبق‌های فرعی و کل طبق‌های تولیدی آن، تفاوت معنی‌داری از این نظر و به‌تun آن از نظر وزن بذور تولیدی در کل طبق‌های گیاه بین ارقام مشاهده نشود (جدول‌های ۳ و ۴). بررسی مقادیر نسبی نشان می‌دهد که در رقم IL111، تعداد و وزن طبق‌های اصلی به ترتیب ۷۵ و ۸۶ درصد کل طبق‌های گیاه را شامل می‌شوند، در حالی که این مقادیر برای PI، به ترتیب ۳۵ و ۵۷ درصد و برای رقم محلی اصفهان به ترتیب ۴۳ و ۵۷ درصد بود. همین تشکیل بذر بیشتر در طبق‌های اصلی که ۹۲ درصد وزن

کل بذرهای تولیدی را شامل می‌شد، خود یکی از دلایل اصلی برتری وزن هزاردانه رقم IL111 بود که در کل تعداد دانه کمتری تولید کرد (جدول ۴). مجذنصیری و همکاران (۲۰۰۳) اظهار داشتند کاهش تعداد دانه موجب اختصاص مواد فتوستزی بیشتر به تعداد کمتری از دانه‌های در حال پرشدن می‌شود و از این طریق دانه‌های بزرگ‌تر تولید می‌گردد. از سوی دیگر، همان‌طور که بیان شد، دو رقم محلی اصفهان و PI تعداد طبق بیشتری نسبت به رقم IL111 تولید کردند. ویلیامز (۱۹۶۲) بیان داشت معمولاً با افزایش تعداد طبق، وزن هزاردانه کاهش می‌یابد که دلیل این امر، افزایش تعداد بذر تولیدی با افزایش تعداد طبق تشکیل شده می‌باشد. بیشتر این بذرها در طبقه‌های فرعی قرار دارند که مواد کمتری نسبت به طبقه‌های اصلی دریافت می‌کنند. هر چند همبستگی بالای تعداد کل بذور تولیدی با تعداد طبق ثانویه ($t=0.74$, $p<0.01$) نشانگر نقش مهم طبقه‌های ثانویه در انعطاف‌پذیری واکنش گیاه به شرایط تنفس اعمال شده و بهبود عملکرد در این شرایط می‌باشد.



شکل ۳- رابطه بین وزن کل طبقه‌های تولیدی در واحد سطح با تعداد کل بذر در سطوح مختلف شوری (شکل الف) و ارقام مختلف (شکل ب). در شکل الف، تیمارهای شوری عبارتند از اعمال شوری در مراحل شاخه‌دهی (▲، خط راست)، تکمه‌دهی (○، خط نقطه‌چین) و گلدنهی (■، خط منقطع). ارقام مورد آزمایش شامل PI (■، خط منقطع)، IL111 (▲، خط نقطه‌چین) و محلی اصفهان (○، خط راست) می‌باشند. معادلات خطوط وایازی در جدول ۷ ارایه شده‌اند.

بررسی خطوط رگرسیونی برآشناخته بین وزن کل بذر تولیدی با ورن بذر در طبقه‌های اصلی و یا فرعی به همراه ضرایب مربوطه (شکل ۱، جدول ۷) نشان می‌دهد که شب افزایشی رابطه وزن کل

بذور به وزن بذور طبقهای اصلی و فرعی در رقم محلی اصفهان یکسان می‌باشد، در حالی که در رقم IL111 این شب برای طبقهای اصلی بسیار کمتر از طبقهای فرعی بوده و رقم PI از این نظر در حد واسطه دو رقم دیگر قرار می‌گیرد (جدول ۷). این امر نشان می‌دهد که در سطوح بالاتر وزن کل بذور تولیدی، سهم طبقهای فرعی در رقم محلی اصفهان نسبت به دو رقم افزایش بیشتری دیگر یافت. همین امر سبب شد که هرچه تخصیص مواد در این رقم به طبقهای بیشتر شود، مواد پروردۀ بیشتری به طبقهای فرعی اختصاص یافته و در کل وزن طبقهای و به تبع آن تعداد دانه تولیدی افزایش پیدا کند (شکل ۳-ب؛ جدول ۷). افزایش تعداد کل بذر در واحد سطح در رقم محلی اصفهان تا حدی ناشی از افزایش بذور واقع در طبقهای فرعی به ویژه در کرت‌هایی که عملکرد بالاتری داشتند (کرت‌هایی که دیرتر با تنفس شوری مواجه شدند، جدول ۴) بود و بنابراین بدینه است که این‌گونه بذور وزن کمتری نسبت به بذور طبقهای اصلی داشته باشند. همین امر خود دلیل کاهش وزن هزاردانه در رقم محلی اصفهان نسبت به دو رقم دیگر می‌باشد. بنابراین با افزایش تعداد بذر رقم محلی اصفهان در واحد سطح، وزن بذر کل با شبکه کمتری نسبت به دو رقم دیگر افزایش یافت (شکل ۲-ب؛ جدول ۷).

واکنش‌های متفاوت ارقام از جنبه میزان بذر تشکیل شده در طبقهای اصلی گیاه سبب شد که در بین تمامی صفات، تنها وزن بذر طبقهای اصلی و کل و نیز تعداد بذر تولیدی تفاوت‌های معنی‌داری در سطوح مختلف برهم‌کنش بین زمان اعمال شوری و ارقام نشان دهنند (جدول ۴). به‌منظور تعیین دقیق‌تر واکنش ارقام به زمان اعمال شوری، برآوردی اثر متقابل ارقام در هر سطح شوری انجام شد (سلطانی، ۲۰۰۶) و بدین‌ترتیب مشخص شد که عمدۀ تفاوت بین ارقام به واکنش آنها به شوری اعمال شده در زمان تکمله‌دهی بر می‌گردد (جدول ۵) و در این بین رقم محلی اصفهان برتری محسوسی از جنبه تعداد و وزن بذور تولیدی نسبت به دو رقم دیگر در این زمان اعمال تنفس نشان داد (جدول ۶). در حقیقت چنین به نظر می‌رسد که شوری اعمال شده در زمان تکمله‌دهی تأثیر بیشتری بر تشکیل گل و باروری گلهایی که بعداً تشکیل شدند گذاشته است و بین زمان اعمال آبیاری با آب شور در زمان گلدهی تا گذشتۀ شوری عصاره اشیاع خاک از حد آستانه تحمل گیاه (۷/۵ دسی‌زیمنس بر متر، شانون، ۱۹۹۷) فاصله زمانی وجود داشته که همین امر سبب تأثیرگذاری کمتر این تیمار بر تعداد بذر و اثرگذاری بیشتر آن بر وزن هزاردانه شده است (جدول ۲). بنابراین بدینه است که هر رقمی که بتواند در زمان تکمله‌دهی گلهای بیشتری در شرایط آبیاری با آب شور تشکیل دهد، از مقاومت نسبی بیشتری به شرایط تنفس شوری برخوردار خواهد بود، به ویژه که رقم محلی اصفهان شاخص برداشت

بالاتری نسبت به دو رقم دیگر داشت که نشان‌دهنده تخصیص بیشتر مواد در این رقم به بخش زایشی و تولید دانه می‌باشد (جدول ۴). در آزمایش کوتروباس و همکاران (۲۰۰۴) نیز تفاوت ارقام از نظر شاخص برداشت مشاهده شد و برترین ارقام شاخص برداشتی معادل ۳۵ درصد داشتند که تقریباً مشابه شاخص برداشت رقم محلی اصفهان در این آزمایش (۳۴ درصد) می‌باشد. هر چند فرید و احسان‌زاده (۲۰۰۶) بین ارقام موردن آزمایش خود تفاوتی از نظر شاخص برداشت مشاهده نکردند.

جدول ۵- برش‌دهی اثر متقابل مجموع مربعات سطوح ارقام در هر سطح اعمال شوری برای صفات وزن و تعداد بذور تولیدی.

زمان اعمال شوری	درجه آزادی	مجموع مربعات	وزن بذر در طبقه‌ای اصلی	تعداد بذر در کل طبقه‌ها	وزن بذر در طبقه‌ای اصلی
شاخص‌دهی	۲	۱۷۵۰/۲۹۸ ^{ns}	۲۳۴۸۶ ^{ns}	۱۶۹۴۲۱۶۵ ^{ns}	
تکمه‌دهی	۲	۲۸۸۷۷/۱۰۰ ^{**}	۵۱۲۲۳ [*]	۷۰۹۹۴۹۸۵ [*]	
گلدهی	۲	۱۳۳۰/۶۵۵ ^{ns}	۱۵۹۲۹ ^{ns}	۵۶۵۱۵۸۸۹ [*]	

^{ns}, ^{*} و ^{**} به ترتیب نشان‌گر علم معنی‌داری و معنی‌داری در سطوح ۰/۰۵ و ۰/۰۱ می‌باشند.

در وضعیتی که تنش در زمان تکمه‌دهی اعمال شد، تعداد و وزن بذر در رقم محلی اصفهان نسبت به رقم PI به ترتیب ۱۹۲/۵ و ۱۹۲/۱ درصد بیشتر بود، در حالی که برتری آن نسبت به رقم IL111 برای تعداد بذر ۸۲/۹ درصد و برای وزن کل دانه‌ها ۳۱/۳ درصد بود. دلیل این کاهش تفاوت نسبت به رقم IL111، تشکیل تعداد دانه بیشتر و وزن هزاردانه بالاتر رقم IL111 می‌باشد (جدول‌های ۴ و ۶). در حالی که با توجه به شاخص برداشت بسیار پائین رقم IL111 در مقایسه با دو رقم دیگر (جدول ۴)، چنین به نظر می‌رسد که این رقم در مراحل بعدی، یعنی زمانی که تنش در زمان گلدهی اعمال شد، توانایی لازم برای پرکردن تمامی دانه‌ها را نداشته که خود موجب کاهش معنی‌دار تعداد دانه‌ها، به ویژه در طبقه‌ای فرعی که با تأخیر زمانی نسبت به طبقه‌ای اصلی تشکیل می‌شوند، و نیز کاهش وزن دانه‌ها شد، هر چند این کاهش معنی‌دار نبود. تأثیرپذیری کمتر وزن دانه‌ها نسبت به تعداد دانه از این رو است که وزن دانه صفتی است که وابستگی بیشتری به ویژگی‌های ژنتیکی رقم دارد و کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرد (احسان‌زاده و زارعیان‌بغدادی، ۲۰۰۳). بنابراین در کل چنین به نظر می‌رسد که رقم IL111 انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به دو رقم دیگر در واکنش به شوری نشان می‌دهد و همین کاهش معنی‌دار تعداد و وزن طبقه‌ای ثانویه در این رقم و به تبع آن

کاهش وزن بذرهای تشکیل شده در طبقهای فرعی و تعداد کل بذور تولیدی آن در واحد سطح سبب شد که این رقم عملکرد نهایی کمتری نسبت به دو رقم دیگر تولید نماید (جدول ۴). تنفس شوری در زمان شاخه‌دهی گیاه موجب کاهش تمامی اجزاء عملکرد از قبیل تعداد و وزن طبقهای و نیز تعداد و وزن بذور تولیدی شد. گرچه این تفاوت‌ها معنی‌دار نبود، ولی برآیند همین تفاوت‌های جزئی سبب شد که عملکرد نهایی در این تیمار به‌طور معنی‌داری کمتر از سایر زمان‌های اعمال تنفس باشد (جدول ۴). عدم تفاوت معنی‌دار شاخص برداشت بین زمان‌های اعمال شوری (جدول ۴) نشان می‌دهد که گیاهان صرف نظر از وقوع تنفس در هر مرحله رشدی، با وجود تفاوت‌های به وجود آمده در کل بیومس تولیدی (داده‌ها نشان داده نشده‌اند) سعی می‌کنند نسبت تقریباً ثابتی از کل مواد پرورده تولیدی را به اندام‌های زایشی تخصیص دهند. به عبارت دیگر در زمان اعمال تنفس مقدار تخصیص مواد کمتر از فتوستتر و تولید مواد تحت تأثیر قرار می‌گیرد. باسیل و کافکا (۲۰۰۲) نیز اظهار داشتند که به نظر می‌رسد گلرنگ دارای ظرفیت تنظیم شاخص برداشت در واکنش به سطوح متوسط شوری خاک و آب آبیاری می‌باشد.

جدول ۶- مقایسه میانگین صفات وزن و تعداد بذر تولیدی در هر سطح اعمال شوری.

تعداد بذر (در متر مربع)	سطح تیمار			
	اعمال شوری	رقم	طبق اصلی	وزن بذر در متر مربع (گرم)
		کل		
۷۳۳۵/۵۶ ^a	۲۳۱/۹۴ ^a	۱۵۱/۳۹ ^a	PI	
۳۹۹۴/۲۲ ^a	۱۴۹/۴۴ ^a	۱۳۲/۷۸ ^a	IL111	شاخه‌دهی
۵۳۵۲/۳۴ ^a	۱۳۷/۲۲ ^a	۱۲۱/۹۴ ^a		محالی اصفهان
۳۴۹۱/۳۰ ^b	۹۵/۰۰ ^c	۷۲/۷۸ ^b	PI	
۵۵۸۵/۰۱ ^b	۲۱۱/۳۹ ^{ab}	۱۹۱/۶۷ ^a	IL111	تکمه‌دهی
۱۰۲۱۳/۵۲ ^a	۲۷۷/۵۰ ^a	۱۹۴/۱۷ ^a		محالی اصفهان
۷۹۱۵/۱۷ ^a	۲۴۲/۵۰ ^a	۱۶۰/۸۲ ^a	PI	
۳۶۸۸/۱۶ ^b	۱۲۸/۸۹ ^a	۱۲۸/۰۶ ^a	IL111	گلدهی
۹۶۵۶/۱۸ ^a	۲۳۱/۱۱ ^a	۱۵۲/۷۸ ^a		محالی اصفهان

برای هر زمان اعمال شوری، مقادیر دارای حروف مشابه در هر ستون دارای اختلاف معنی‌داری بین ارقام در سطح معنی‌داری ۰/۰۵ نمی‌باشند.

هزینه‌های اضافی گیاه در زمان مواجه شدن با تنش شوری، مانند هزینه تعديل اسمزی^۱ و افزایش تخصیص مواد به ریشه از یک سو و تأثیرپذیری منفی فتوستتر از سوی دیگر، موجب کاهش ساخت مواد، به ویژه موادی مانند روغن که تولید آنها انرژی بیشتری می‌طلبد، می‌شود (شانون، ۱۹۹۷) و میزان این کاهش بسته به زمان و شدت اعمال تنش متفاوت می‌باشد. در این مطالعه مشخص شد که اعمال تنش شوری در زمان شاخه‌دهی سبب کاهش درصد روغن و در نتیجه عملکرد روغن نسبت به زمان‌های دیرتر اعمال شوری شد (جدول ۴). کافی و رستمی (۲۰۰۷) اظهار داشتند که قطع آبیاری در مرحله تکمه‌دهی ارقام مختلف گلرنگ بهارهای که با آب شور آبیاری شده بودند، باعث کاهش معنی‌دار عملکرد و درصد روغن شد. هر چند در آزمایش آنها، تنها اعمال تنش در مراحل رشد زایشی، در شرایط تنش تواأم خشکی و شوری، با یکدیگر مقایسه شده‌اند. همبستگی مثبت و معنی‌داری بین عملکرد دانه با عملکرد روغن ($n=27$; $t=0.97^{***}$) و درصد روغن ($n=27$; $t=0.80^{**}$) وجود داشت. این یافته‌ها و نیز همبستگی مثبت عملکرد دانه با بیومس کل و تعداد طبق تولیدی، در راستای نتایج امیدی‌تبریزی و همکاران (۱۹۹۹) است که تجزیه علیت برروی عملکرد دانه و روغن در آزمایش آنها نشان داد که جهت افزایش روغن، ابتدا باید عملکرد دانه را افزایش داد که خود تابعی از بیومس گیاه و تعداد طبق در بوته می‌باشد.

حساسیت بیشتر IL111 نسبت به شوری در مقایسه با دیگر ارقام نه تنها در عملکرد کل مشهود بود، بلکه این رقم درصد و عملکرد روغن بسیار کمتری نسبت به دو رقم دیگر تولید نمود (جدول ۴). در حالی که دو رقم PI و محلی اصفهان دارای درصد روغن دانه و نیز عملکرد روغن بالاتری بودند، که گرچه تفاوت معنی‌داری از این لحاظ بین آنها وجود نداشت، ولی رقم محلی اصفهان ۱۲/۴ درصد عملکرد روغن بیشتری نسبت به PI تولید نمود. مطالعات یوری و همکاران (۱۹۷۲)، راشدمحصل و بهدانی (۱۹۹۵) و مجدنصیری و همکاران (۲۰۰۳) نیز تفاوت‌های ارقام از نظر عملکرد دانه و درصد روغن را متذکر شده و تأکید کرده‌اند که درصد روغن به‌طور عمده متأثر از ژنتیک گیاه می‌باشد. یکی از دلایل اصلی پایین بودن درصد و عملکرد روغن در رقم IL111، دانه‌های درشت‌تر تولیدی این رقم و وزن هزاردانه بالاتر آن می‌باشد (جدول ۴)، زیرا مشخص شده است که دانه‌های کوچک‌تر معمولاً درصد پوسه کمتری نسبت به دانه‌های بزرگ‌تر داشته و بنابراین درصد روغن بیشتری دارند (asherی و همکاران، ۱۹۷۴)

1- Osmotic Adjustment

مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد (۲) شماره ۴ ۱۳۸۸

جدول ۷- عرض از مبداء، شبیب و ضرایب تبیین خطوط رگرسیونی برآشناخته بین اجزاء مختلف عملکرد. شکل کلی معادله رگرسیونی خطی به صورت $y = a + bx$ می‌باشد که در آن y متغیر وابسته، x متغیر مستقل و a و b ضرایب رگرسیونی می‌باشند.

اعمال شوری	ضریب تبیین	b	a	ارقام	ضریب تبیین	b	a	اعمال شوری
متغیر مستقل = وزن بذر در طبقه‌ای اصلی (گرم در مترمربع)؛ متغیر وابسته = وزن بذر کل (گرم در مترمربع) (شکل ۱)								
گلدهی	-۰۵۳/۰۰۵۲	۰/۷۸	۱/۷۲۴۵	PI	۶/۶۵۸۸	۱/۴۲۷۲	۰/۸۹	۰/۸۹
تکمدهی	-۷/۰۴۱۶	۰/۸۹	۱/۳۱۲۷	IL111	۱۴/۷۹۴	۱/۱۸۰۳	۰/۹۰	۰/۹۰
شاخدهی	-۴۷/۵۴۶	۰/۶۲۰۹	۱/۶۲۰۹	محالی اصفهان	۷۲/۰۷۹	۱/۸۳۸۵	۰/۹۲	۰/۹۲
متغیر مستقل = وزن بذر در طبقه‌ای فرعی (گرم در مترمربع)؛ متغیر وابسته = وزن بذر کل (گرم در مترمربع) (شکل ۱)								
گلدهی	۱۲۷/۲۲	۰/۸۳	۱/۳۷۳	PI	۶۹/۲۶	۱/۹۶۰۸	۰/۷۴	۰/۷۴
تکمدهی	۱۰۹/۶۸	۰/۶۵	۲/۰۳۴۳	IL111	۱۳۴/۱۹	۱/۹۹۸۶	۰/۷۰	۰/۷۰
شاخدهی	۱۰۸/۱۵	۰/۸۲	۱/۷۲۶	محالی اصفهان	۱۰۶/۵۱	۱/۸۴۴۱	۰/۹۲	۰/۹۲
متغیر مستقل = تعداد بذر در مترمربع؛ متغیر وابسته = وزن بذر کل (گرم در مترمربع) (شکل ۲)								
گلدهی	۵۵/۱۷۶	۰/۰۲۰۵	۰/۰	PI	-۱۶/۶۷۵	۰/۰۳۳۱	۰/۹۹	۰/۹۹
تکمدهی	۲۵/۲۴۳	۰/۰۲۶۳	۰/۰	IL111	-۲۲/۵۲	۰/۰۴۲	۰/۹۷	۰/۹۷
شاخدهی	۶۱/۷۵۶	۰/۰۱۷۹	۰/۰	محالی اصفهان	-۱۰/۲۴۳	۰/۰۲۶۸	۰/۹۳	۰/۹۳
متغیر مستقل = وزن کل طبقه‌ای تولیدی (گرم در مترمربع)؛ متغیر وابسته = تعداد بذر در مترمربع (شکل ۳)								
گلدهی	-۲۲۱۲/۳	۱۷/۵۲	۰/۷۶	PI	-۱۵۳۷/۲	۱۶/۰۴۴	۰/۹۶	۰/۹۶
تکمدهی	۶۰۸/۱	۱۱/۶۳۵	۰/۸۶	IL111	۱۲۵۱/۷	۸/۸۰۳۴	۰/۶۸	۰/۶۸
شاخدهی	-۴۱۰۲/۹	۲۶/۱۲۸	۰/۹۳	محالی اصفهان	۲۳۷۰/۲	۱۱/۳۸۹	۰/۷۹	۰/۷۹

در کل چنین به نظر می‌رسد که زمان تکمدهی گیاه یکی از حساس‌ترین مراحل رشدی گیاه گلرنگ به تنش شوری می‌باشد و ارقامی که بتواند ماده خشک بیشتری به بخش‌های زایشی خود تخصیص داده و طبقه‌ای فرعی بیشتری را تشکیل داده و بارور سازند، از انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به تنش اعمال شده برخوردار بوده و قادر به تولید عملکرد دانه و روغن بیشتری در این شرایط می‌باشند. گرچه ارقام خارجی ممکن است تحت شرایط مطلوب نمود بهتری داشته و عملکرد بیشتری تولید نمایند، ولی تحت تنش‌های محیطی رایج در ایران مانند تنش شوری و یا خشکی، ارقام محلی ایران، مانند رقم محلی اصفهان که در طی زمان با شرایط کشور ما تطابق پیدا کرده‌اند، برتری قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهند.

سپاسگزاری

این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه بیرجند انجام شده است. نگارندگان خود را موظف می‌دانند از بخش تحقیقات دانه‌های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (کرج)، به ویژه دکتر شیرانی راد به‌دلیل تأمین بذور مورد نیاز صمیمانه تشکر نمایند. همچنین از زحمات دکتر فرزاد پاکنژاد، عضو محترم هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سپاسگزاری می‌شود.

منابع

- Ashraf, M., and O'leary, J.W. 1996. Response of some newly developed salt tolerant genotypes of spring wheat to salt stress. I. Yield components and ion distribution. *J. Agron. Crop Sci.* 76: 91-101.
- Ashri, A., Zimmer, D.E., Urie, A.L., Cahaner, A., and Marani, A. 1974. Evaluation of the world collection of safflower (*Carthamus tinctorius* L.). IV. Yield and yield components and their relationships. *Crop Sci.* 14: 799-820.
- Bassil, E.S., and Kaffka, S.R. 2002. Response of safflower (*Carthamus tinctorius* L.) to saline soils and irrigation. I. Consumptive water use. *Agric. Water Manage.* 54: 67-80.
- Dajue, L., and Mündel, H.H. 1996. Safflower (*Carthamus tinctorius* L.). Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. Institute of Plant Genetics and Crop Plant research, Gatersleben/International Plant Genetic Resource Institute, Rome, Italy, 83p.
- Ehsanzadeh, P., and Zareian Baghdad-Abadi, A. 2003. Yield and yield components and growth characteristics of two safflower genotypes under varying plant densities. *J. Sci. & Technol. Agric. Natur. Resour.* 7: 1. 129-140.
- FAO. 1988. World agriculture toward 2000: an FAO study. Alexandratos, N. (ed.). Bellhaven Press, London, 338p.
- Farid, N., and Ehsanzadeh, P. 2006. Yield and yield components of spring-sown safflower genotypes and their response to shading on inflorescence and the adjacent green tissue in Isfahan. *J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resour.* 10: 1. 189-198.
- Francois, L.E., and Bernstein, L. 1964. Salt tolerance of safflower. *Agron. J.* 56: 35-37.
- Hans-Henning, M., Blackshaw, R.E., Byers, J.R., Huang, H.C., Johnson, D.L., Keon, R., Kubik, J., McKenzie, R., Otto, B., Roth, B., and Stanford, K. 2004. Safflower production on the Canadian prairies. Agriculture and Agri-Food Canada. Lethbridge, Alberta. 43p.

- Hashemi-Nia, S.M., Koocheki, A., and Ghahreman, N. 1997. The use of saline waters in sustainable agriculture. Publication of Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Mashhad, Iran, 236p. (Translated In Persian).
- Kaffi, M., and Rostami, M. 2007. Yield characteristics and oil content of three safflower (*Carthamus tinctorius*) cultivars under drought in reproductive stage and irrigation with saline water. *Iranian J. Field Crops Res.* 5: 121-132.
- Knowles, P.F. 1989. Safflower, Pp: 363-374, In: Groebbeln, R., Downey, K., and Ashri, A. (eds.), *Oil crops of the world*. McGraw-Hill, New York.
- Koutroubas, S.D., Papakosta, D.K., and Doitsinis, A. 2004. Cultivar and seasonal effects on the contribution of pre-anthesis assimilates to safflower yield. *Field Crops Res.* 90: 263-274.
- Majd-Nassiri, B., Karimi, M., Nour-Mohamadi, Gh., and Ahmadi, M.R. 2003. The evaluation of yield, yield components and physiological characteristics of five safflower genotypes in spring and summer sowing. *J. Agric. Sci.* 9: 3-18.
- Omidi Tabrizi, A.H., Ghannadha, M.R., Ahmadi, M.R., and Payghambari, S.A. 1999. Evaluation of some important agronomic traits of safflower using multivariate statistical methods. *Iranian J. Agric. Sci.* 30: 817-827.
- Rashed, M.H., and Behdani, M.A. 1995. The effect of cultivars and population densities on yield and yield components of safflower (*Carthamus tinctorius* L.). *Iranian J. Agric. Sci.* 110-124.
- Rhoades, J.D., Kandiah, A., and Mashali, A.M. 1992. The use of saline waters for crop production. FAO irrigation and drainage, 48p.
- Shannon, M.C. 1997. Adaptation of plants to salinity. *Adv. Agron.* 60: 75-120.
- Soltani, A. 2006. Statistical methods in agricultural sciences and natural resources. Publication of Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Mashhad, Iran, 74p.
- Tavakoli, A. 2002. The evaluating effects of irrigation termination in different growth stages on yield and yield components of safflower cultivars. M.Sc. thesis, Faculty of Agriculture, Tehran University.
- Williamz, J.H. 1962. Influence of plant spacing and flower position on oil content of safflower. *Crop Sci.* 2: 475-477.
- Yassari, T., Shahsavari, M., Barzegar, A., and Omidi, A.H. 2005. Study of developmental stages and relationship between of them and seed yield in ten advanced safflower genotypes. *Pajouhesh & Sazandegi*, 68: 75-83.
- Zinali, A. 1999. Safflower, Publication of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran, 137p.



EJCP., Vol. 2 (4): 113-134
www.ejcp.info



Responses of yield and yield components of three safflower (*Carthamus tinctorious L.*) spring cultivars to salinity induced at different growth stages

***M. Jami Alahmadi¹, M.A. Behdani¹ and A. Rahimi²**

¹Assistant Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, ²B.Sc. in Agronomy, the Expert of Experimental Station

Abstract

Salinity stress is one of the most important environmental constraints that have been limited agricultural production in Iran. Therefore, introducing suitable cultivars having desirable yield under salinity stress will lead to increase of production efficiency. In order to study the response of spring safflower cultivars to salinity, an experiment was carried out at the Experimental Station of the University of Birjand during 2007. The study was done as a split-plot experiment based on a Completely Randomized Block Design with three replications. Treatments were three times of salinity application (at branching, budding, and flowering) as main plots and three cultivars (Mahali Isfahan (a local variety), PI, and IL111). Salinity stress was induced using well water with an EC equal to 8.6 dSm⁻¹. Results showed salinity had non-significant effects on yield components of cultivars, but the effects followed by these small changes influenced seed and oil yields and oil percentage significantly by time of salinity exertion. There was a significant difference between cultivars in yield and also the most of yield components, with notable superiority of Mahali Isfahan over PI and IL11. Slicing of interactions of cultivars in each time of saline water application indicated that majority of differences between cultivars was related to their response to salinity induced at budding, with Mahali Isfahan had the highest seed weight and seed number. than others. In general, it seems that Mahali Isfahan cultivar had more adaptability to irrigation with saline water. If this cultivar is irrigating with fresh water during reproductive phase, especially between budding to full flowering, it can producea reasonable seed and oil yields.

Keywords: Safflower; Cultivars; Salinity; Yield; Oil; Yield components

*- Corresponding Author; Email: mja230@yahoo.com

